

ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES

DE

COCCINELLIDES DE L'INDE [COLÉOPT.]

appartenant à la collection de M. Andrewes (de Londres)

par le D^r A. SICARD.

Solanophila incauta Muls. — L'exemplaire unique que j'ai eu à examiner diffère du type décrit de Java par la couleur foncière des élytres qui est rouge avec l'extrémité d'un jaune fauve. En outre, le point 4 (antéapical), au lieu d'être au bord externe, est nettement discal, à peine plus rapproché du bord externe que de la suture.

Epilachna impieticollis, n. sp. — Subhémisphérique, presque gibbeuse en dessus, le point culminant de la convexité des élytres situé à peu près au milieu de la longueur totale de l'insecte; d'un testacé roussâtre avec des taches noires. Tête rousse, à pubescence rare, à pointillé fin, avec une vague impression enfoncée triangulaire; labre très long; antennes et palpes roux. Corselet arrondi et finement rebordé sur les côtés, un peu rétréci en avant, avec les angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus, tronqué au-devant de l'écusson et sinué de chaque côté de la truncature; d'un aune testacé, couvert de poils jaunâtres assez longs; à ponctuation fine, simple et assez dense. Écusson plus long que large, enfoncé, de couleur testacée. Élytres plus larges que le corselet à la base, arrondis aux épaules, en courbe régulière jusqu'à l'extrémité, à pubescence jaunâtre, plus longue que celle du corselet, à ponctuation fine, mêlée de nombreux points plus gros, peu profonds, presque en ligne et plus enfoncés le long du bord externe; d'un testacé fauve avec 13 points noirs (pris ensemble), disposés dans l'ordre suivant : 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$; point 1 arrondi, sur le calus, ne touchant pas la base; 2 allongé, à l'écusson, dont il entoure la moitié postérieure, prolongé en arrière jusqu'au sixième environ de la longueur de la suture; 3 et 4 en rangée transversale au tiers de la longueur, 3 en ovale transversal rapproché du bord externe, 4 un peu plus antérieur, deux fois plus près de 3 que de la suture; 5 commun, environ à la moitié de la longueur, sur la suture, un peu en arrière du point culminant de la convexité des élytres; 6 et 7 en rangée transversale aux deux tiers de la longueur, 6 près du bord externe, dont il n'est séparé que par la tranche, étendu jus-

qu'au tiers ou un peu moins de la largeur; 7 transversal, deux fois plus large que long, aussi éloigné du point 6 que de la suture; 8 commun, apical, en forme de croissant à convexité tournée en dehors, étendu à peu près d'une même longueur sur la suture et sur le bord externe. Épipleures à pubescence longue et peu dense, fauves, avec une bande vague, enfumée, le long du milieu. Dessous d'un testacé plus clair que le dessus, avec le métasternum (sauf les épimères et les épisternes) d'un noir brillant. Plaques abdominales n'atteignant pas le bord postérieur du premier arceau, en angle arrondi postérieurement, sinuées à leur bord externe qui remonte un peu en dedans de l'angle externe du premier segment abdominal. Pieds entièrement roux, ongles bifides à l'extrémité (la branche externe étant plus grêle que l'interne) et munis à la base d'une dent courte et large. — Long. : 4,5-5 mill.

Cette espèce est voisine de *E. Stephensi* Muls., dont la distinguent sa forme arrondie, la présence de deux points au lieu d'un seul près du bord externe et son corselet sans tache. L'*Epilachna circellaris* Weise, qui m'est inconnue, doit, d'après la description, en être très voisine, mais s'en distingue par son corselet muni de deux gros points noirs. *Solanophila fallax* Weise, de Bornéo, est plus grosse, plus régulièrement convexe, tachée différemment et de couleur foncière d'un brun rouge. *S. nilghirica* Weise, à peu près de même taille, n'a qu'un seul point à la rangée postérieure et pas de point apical. Les deux dernières espèces se distinguent, d'ailleurs, par les ongles dépourvus de dent à la base.

E. subclathrata, n. sp. — En ovale court, médiocrement convexe. Tête rousse, à ponctuation très dense, presque ruguleuse mais superficielle, à pubescence très clairsemée. Palpes et antennes d'un roux testacé. Corselet roux, de la couleur de la tête, avec les côtés plus pâles, non sinué à la base, régulièrement arrondi sur les côtés, à angles postérieurs obtus et émoussés, les antérieurs aigus mais arrondis, fortement échancré au bord antérieur; couvert d'une pubescence assez courte et dense d'un jaune grisâtre; ponctuation très fine et très serrée. Écusson jaune, finement pointillé et pubescent. Élytres notablement plus larges que le corselet à la base, régulièrement arrondis sur les côtés avec les angles huméraux largement arrondis et l'angle apical à peu près droit; couverts d'une pubescence d'un jaune grisâtre assez longue et assez peu dense; à ponctuation très fine et extrêmement serrée entremêlée de nombreux points plus gros et plus profonds; d'un jaune roux à reflets dorés avec trois bandes

transversales anguleuses et l'extrémité noires, la suture également noire à partir de la 2^e bande jusqu'à l'extrémité; la première bande transversale couvrant la base sur le dixième environ de la longueur, de l'écusson à l'angle huméral, dilatée au niveau de la suture sur laquelle elle se prolonge en pointe, jusqu'au sixième environ de la longueur et au niveau du calus qu'elle recouvre entièrement; la 2^e bande paraissant formée de 3 taches largement unies : 1^o une tache suturale commune, en triangle à base antérieure et dont le sommet se continue par une fine bordure suturale, 2^o une tache discale triangulaire à base postérieure liée par son angle postéro-interne à la partie externe de la base de la première tache, à sommet dirigé vers la base et n'atteignant pas tout à fait la première bande transversale, 3^o une tache quadrangulaire au bord latéral liée par son angle antéro-interne à la partie externe de la base de la 2^e tache; la 3^e bande transversale un peu anguleuse antérieurement et un peu élargie en dehors; l'extrémité avec une petite tache triangulaire noire, la suture très étroitement noire entre la 2^e bande et l'extrémité. Épipleurs testacés, à bord externe étroitement noir (un peu plus largement au niveau de la 2^e bande). Dessous roux avec le métasternum sauf les parties latérales, le premier arceau ventral (sauf une étroite bordure rousse) et le tiers médian des trois arceaux suivants noirs. Plaques abdominales atteignant les quatre cinquièmes de l'arceau, tronquées postérieurement, indistinctes à leur partie externe. Pieds roux, ongles bifides, à dent externe plus longue et plus grêle et avec une dent à la base, plus étroite mais presque aussi longue que la dent interne. — Long. : 6 mill.

Nilghiri Hills, un seul exemplaire.

Buprestodera, n. gen.

En ovale allongé, glabre, assez convexe. Tête inclinée, visible en dessus, enfoncée dans le prothorax jusqu'au delà du bord postérieur des yeux, légèrement convexe entre les yeux qui sont petits, ovales d'avant en arrière, entamés par des joues étroites; épistome échancré en arc de cercle large en avant; labre arrondi, assez long; mandibules fortement bifides à l'extrémité, très robustes. Antennes courtes, à premier article renflé, à massue grande, fusiforme, de trois articles; palpes maxillaires grands, à dernier article sécuriforme. Corselet presque droit sur les côtés, avec les angles antérieurs très avancés, fortement échancré en avant, en arc de cercle large et non rebordé à la base, avec les angles postérieurs obtus et arrondis, peu marqués.

Écusson petit, en triangle allongé. Élytres à peine plus larges que le corselet à la base, régulièrement ovales, arrondis (pris ensemble) à l'extrémité. Prosternum convexe sur sa partie médiane, non caréné, rétréci entre les hanches, coupé droit à la partie postérieure, juste au niveau de la partie postérieure des hanches antérieures, en arc de cercle fortement convexe en avant, formant ainsi une espèce de mentonnière qui empêche la tête de se placer perpendiculairement au plan du reste du corps, creusé, tout à fait sous les angles antérieurs, d'une fossette ovale peu profonde, et à bords peu abrupts. Mésosternum transversal, trois fois aussi large que long, sinué au bord antérieur, droit en arrière. Métastrernum grand, convexe, avec un sillon étroit longitudinal. Ventre de cinq arceaux distincts, le premier grand, à prolongement intercoxal large, en arc de cercle aplati en avant, 2, 3, 4 très étroits, 5 aussi long que les deux précédents. Plaques abdominales en arc de cercle aplati, n'atteignant pas le bord postérieur de l'arceau, leur partie externe remontant parallèlement au bord externe du premier segment; épisternes et épimères du métathorax étroits et allongés. Épileures plans, rétrécis au niveau des épimères du métastrernum, devenant plus distincts vers l'extrémité. Pieds assez robustes, fémurs sillonnés en dessous pour recevoir l'arête interne du tibia, ces derniers sillonnés presque sur toute leur longueur pour recevoir le tarse; tarses longs, ongles grêles, simples à l'extrémité, appendiculés à la base.

Ce genre vient se placer près du genre *Adalia* par ses plaques abdominales complètes et non anguleuses; il s'en distingue par ses ongles non bifides et par son prosternum avancé en forme de mentonnière. Il ne comprend jusqu'ici que l'espèce l'espèce suivante.

B. mimetica, n. sp. — Ovalaire, médiocrement convexe, d'un rouge de groseille varié de noir et de jaune en dessus. Tête rouge, à ponctuation fine et assez dense, avec le labre plus clair; palpes roux; antennes rousses à massue noire. Corselet de même couleur que la tête, conformé comme il a été dit, à ponctuation très fine et très superficielle. Écusson concolore. Élytres d'un rouge de groseille avec l'extrême liséré de la tranche très étroitement noir, trois taches noires et deux lunules jaunes sur chacun: tache 1 sur le calus, la plus grosse, touchant la base, éloignée du bord externe d'une distance égale à la moitié de la largeur, entourée sur les trois quarts postérieurs d'une lunule jaune en forme de croissant, assez vaguement limitée en arrière; 2 de moitié plus petite que 1, aux trois cinquièmes de la longueur sur le disque, mais un peu plus près du bord externe que de

la suture; 3 arrondie, presque aussi grosse que 1, aux quatre cinquièmes de la longueur, deux fois plus près du bord externe que de la suture, séparée de la tache 2 par une lunule jaunâtre assez peu marquée, en forme de croissant large, qui embrasse toute sa partie antéro-latérale. Ponctuation plus forte et plus espacée que celle du corselet, éparse. Épipleures, dessous du corps et pieds roux. — Long. : 4,5 mill.

Cette espèce, par son système de coloration, rappelle tout à fait *Sticholotis Hitteri* Weise, du Japon, mais elle a les palpes maxillaires sécuriformes, le prosternum avancé à la partie antérieure. Ce dernier insecte diffère d'ailleurs, en outre, par sa taille plus petite (3 mill.), sa forme arrondie et la large bordure suturale et externe noire des élytres.

Coelophora bisellata var. **nudipennis**, nov. — Cette variété diffère de type par l'absence complète de taches sur les élytres. Les taches du corselet (deux très rapprochées, de chaque côté de la ligne médiane et une plus petite arrondie tout à fait dans l'angle postérieur) ainsi que les caractères de la ponctuation extrêmement superficielle, peu dense, presque obsolète, permettent de rapporter cette variété à la *C. bisellata* dont la forme typique se trouve dans l'Inde et à Java.

Pullus harejoides, n. sp. — Très voisin comme coloration de *Scymnus hareja* Weise. En ovale court. Tête d'un flave testacé pâle, à ponctuation fine et assez dense avec les yeux saillants, les antennes et les palpes d'un jaune testacé pâle. Corselet de même couleur, très transversal, à côtés légèrement arrondis, non sinué à la base, couvert d'une pubescence jaunâtre hérissée, peu dense, à ponctuation fine, simple et assez serrée. Écusson jaune. Élytres de la largeur du corselet à la base, à ponctuation un peu plus forte que celle du corselet, à calus huméral peu saillant, à côtés faiblement arrondis jusqu'aux $2/3$ de la longueur, en courbe large dans le dernier tiers; d'un jaune pâle, avec une bordure basale, une bordure suturale et une bordure externe noires, ces bordures réunies en arrière en laissant la partie postérieure largement de la couleur foncière, cette bordure couvrant les trois quarts de la suture, toute la base sur le sixième environ de la longueur, les trois quarts antérieurs du bord externe d'où elle se réunit obliquement à la bordure suturale, laissant ainsi sur chaque élytre l'extrémité et une tache discale en forme de triangle allongé, curviligne en dehors, d'un jaune pâle. Dessous d'un jaune pâle passant au brun sur le métasternum. Épipleures noirs. Pieds d'un jaune testacé. Plaques

abdominales complètes, atteignant environ les quatre cinquièmes de l'arceau, un peu aplaties postérieurement ; posternum aplati. — Long. : 4,7 mill.

Distinct de *Scymnus hareja* par sa forme générale plus courte, ses plaques abdominales complètes, sa couleur d'un jaune plus pâle, la tache élytrale plus grande et de forme différente.

P. zonatus, n. sp. — En ovale assez allongé, à côtés presque parallèles, médiocrement convexe. Tête d'un roux brun à pointillé très fin et assez dense, avec les palpes et les antennes de même couleur et les mandibules noirâtres. Corselet à peine sinué à la base, lobé au milieu au-devant de l'écusson, à côtés à peine arrondis, d'un roux brunâtre sans tache, plus pâle sur les côtés et en avant, à ponctuation extrêmement fine, à pubescence longue et roussâtre. Écusson brun, petit, transversal, en triangle arrondi largement au sommet, pointillé. Élytres de la largeur du corselet à la base, presque parallèles ou très faiblement arrondis jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur, ayant leur plus grande largeur vers le milieu, terminés en cercle large à l'extrémité; ponctuation fine mais plus grosse que celle du corselet, avec deux lignes de points enfoncés de chaque côté de la suture, partant de l'extrémité de l'écusson et enclosant, sauf en arrière, un espace oblong juxtasutural à ponctuation très fine et à pubescence très claire; couverts sur le reste de leur surface de poils longs, jaunâtres, serrés, masquant un peu la couleur foncière, et inclinés en diverses directions, ce qui lui donne un aspect nuageux. Élytres noirs avec l'extrémité testacée et le disque brun; la tache apicale testacée couvrant sur la suture environ les tiers postérieur de la longueur, sur le bord externe les deux cinquièmes, et convexe en avant sur chaque étui; la tache discale brune étendue de la base à la moitié de la longueur et couvrant la moitié médiane de la largeur, si bien qu'on peut considérer les élytres comme bruns avec une zone noire circonscrivant la partie brune (ces deux couleurs peu nettement limitées) et l'extrémité apicale d'un testacé roussâtre. Dessous d'un brun de poix plus foncé sur le métasternum et passant au roussâtre sur les côtés et à l'extrémité de l'abdomen. Prosternum très finement carinulé, à carènes parallèles non réunies antérieurement. Mésos et métasternum très fortement marqués de gros points enfoncés et serrés; ponctuation de l'abdomen plus faible sauf sur le prolongement intercoxal qui est marqué de points aussi gros mais moins serrés que ceux du métasternum. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux quatre cinquièmes de l'arceau, à ponctuation plus fine que le reste du dessous du corps,

avec un espace lisse à leur partie postéro-externe. Épipleures très ponctués, d'un brun foncé, concaves. Pieds d'un roux brunâtre. — Long. : 2,6-2,8 mill:

Nephus Severini Weise. — M. Weise (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVI, p. 28) indique seulement les variétés de coloration par défaut. Un des exemplaires de M. Andrewes présente une tache basale foncée prolongée sur la suture et le long du bord externe. En outre, le point oblique juxtasutural est prolongé en forme de fer à cheval, à concavité regardant la base et, près de l'extrémité antérieure de chacun des points du croissant ainsi formé, il existe un autre petit point noir. La bordure suturale est prolongée environ jusqu'au tiers, la bordure externe jusqu'aux deux tiers de la longueur.

Seymnus Andrewesi, n. sp. — En ovale court, finement pubescent, dessus luisant à ponctuation simple très fine et dense. Tête d'un jaune d'ocre avec les palpes et les antennes un peu plus pâles. Corselet transversal, à côtés presque droits, non sinué à la base, avec les angles antérieurs proéminents et la partie moyenne de l'échancrure arrondie en avant; jaune comme la tête avec une tache noire couvrant les deux tiers moyens de la base, avancée en se rétrécissant jusqu'au près du bord antérieur qui reste étroitement jaune et occupant à ce niveau une largeur égale à l'espace interoculaire; ponctuation fine, pubescence assez longue, couchée, inclinée vers les bords latéraux. Écusson noir, en triangle allongé, ponctué. Élytres de la largeur du corselet à la base, régulièrement ovalaires, ayant vers le milieu leur plus grande largeur, à ponctuation un peu plus forte que celle du corselet, à pubescence grisâtre couchée, à calus huméral petit, d'un jaune luisant avec la suture, une tache à la base et une bande oblique d'un noir profond. La tache basale transversale couvrant le tiers externe de la base, en forme de bande contiguë à la tache noire du corselet mais un peu moins large, couvrant environ le dixième de la longueur, coupée carrément à sa partie externe et à sa partie postérieure; la bordure suturale assez large couvrant à peu près le huitième de la largeur des élytres, à peu près parallèle jusqu'aux quatre septièmes où elle se dilate en forme de tache arrondie au niveau où la bande transversale se réunit à la suture, réduite de là jusqu'à l'extrémité à une très étroite lisière noirâtre; la bande transversalement oblique étendue à sa partie antérieure depuis le calus huméral jusqu'à un peu plus de la moitié de la longueur où elle s'unit à la suture en formant une grosse tache arrondie; couvrant obliquement en dehors depuis le calus huméral jusqu'à la moitié du bord externe, formant

postérieurement une ligne sinueuse étendue depuis le milieu du bord externe aux deux tiers de la longueur, paraissant ainsi formée de deux taches, une suturale, une juxtalatérale réunies par une partie plus étroite. Dessous d'un brun noir ainsi que les pieds avec les épipleures, les côtés de l'abdomen et le dernier segment abdominal plus clairs. Prosternum avec deux fines carènes non réunies au sommet, Plaques abdominales en arc de cercle, réunies au bord postérieur du premier segment, formant une fossette très concave. — Long. : 2 mill.

Les plaques abdominales sont celles d'un *Diomus* mais le prosternum est muni de deux fines carènes.

Le *Nephus Severini* Weise a quelque analogie de dessin avec cette espèce mais outre les caractères génériques, il est plus petit, plus allongé et les parties jaunes sont beaucoup plus pâles.

Stictobura semipolita, n. sp. — Hémisphérique, à convexité très accusée et régulière. Tête d'un noir brun foncé avec le labre d'un brun clair, à ponctuation dense et assez forte, donnant un aspect chagriné. Antennes longues et grêles, à massue fusiforme très effilée, rousses, à massue légèrement rembrunie; palpes maxillaires d'un roux brunâtre, à dernier article plus foncé. Corselet mat, finement rebordé à la base, à côtés presque droits jusqu'aux deux tiers, puis largement arrondis, à angles antérieurs en demi-cercle large, à échancrure antérieure arrondie, convexe dans sa partie médiane, à ponctuation bien marquée mais assez peu dense; couleur foncière d'un brun noir foncé. Écusson petit, triangulaire, noir. Élytres plus larges que le corselet à la base, régulièrement arrondis à partir de la base jusqu'à l'extrémité et munis à leur partie externe d'un rebord étroit, relevé en gouttière et épaissi, de largeur à peu près uniforme jusqu'aux quatre cinquièmes de la longueur où il se rétrécit progressivement pour disparaître entièrement à l'extrémité; suture légèrement enfoncée dans son cinquième antérieur; très brillants, à ponctuation formée de points petits, bien nets et clairsemés; d'un rouge cerise avec une bordure périphérique noire; la bordure suturale renflée au milieu où elle est égale au quart de la largeur, la bordure basale égale à peu près au huitième de la longueur, l'externe plus large, dilatée brusquement au milieu, puis rétrécie et dilatée de nouveau à l'extrémité où elle se joint à la bordure suturale, laissant ainsi de la couleur foncière une tache en forme de sablier. Ailes membraneuses, très courtes, en partie atrophiées. Dessous d'un roux brun plus foncé sur le métasternum; ponctuation forte et assez clairsemée sur la poitrine

et le premier arceau ventral, plus superficielle et plus fine sur le reste. Pieds d'un brun noir avec les tarses plus clairs. — Long. : 4-4,5 mill.

ab. α **fuscipes**. — Élytres rouges, à bordure externe noire, étroite, pieds jaunâtres.

ab. β **testaceicollis**. — Comme α , mais avec le corselet jaune et les pieds flaves.

Il doit probablement exister, en outre, des variétés par excès dans lesquelles la tache rouge de chaque élytre est divisée en deux, mais il n'y en avait pas dans la série, pourtant assez considérable, d'exemplaires qui m'ont été communiqués par M. Andrewes.

Le genre *Stictobura* a été créé par Crotch pour un insecte de l'Inde, rapporté par Mulsant (d'après un individu immature et incomplet) au genre *Calvia*. C'est le même insecte qui a été décrit par Weise sous le nom de *Sticholotis Andrewesi*, ainsi que j'ai pu m'en convaincre par la comparaison du type de M. Andrewes avec un exemplaire de la collection Janson, étiqueté par Crotch. M. Weise avait d'ailleurs fait de cet insecte le type d'un sous-genre (*Apterolotis*). Ce genre diffère du genre *Sticholotis* par la longueur des antennes qui sont très grêles, à massue peu renflée, longue et acuminée, par l'absence de calus huméral, par les ailes membraneuses absentes ou atrophiées, par les palpes maxillaires moins nettement coniques, par les plaques abdominales incomplètes, par les élytres munis d'un bourrelet à la partie externe de la tranche, par la longueur du premier article des tarses et les épipleures sans fovéoles. Il comprend les espèces suivantes : *S. pallideguttata* Muls. (= *Andrewesi* Weise), *gibbula* Weise, *semipolita* Sic.

Je ne crois pas que *Jauravia limbata* Mots. se rapporte à ce genre, Motschulsky indiquant expressément qu'il s'agit d'une espèce pubescente : « brevissime albido puberula » (*Jauravia pallidula*), dont *limbata* ne diffère que par sa poitrine et ses élytres noirs, à large bordure blanche; une deuxième espèce décrite sous le même nom par le même auteur est dite « vix puberula ». Sans doute ces descriptions se rapportent à des *Ortalia*, d'autant que l'auteur les compare comme forme générale à la *Lasia globosa*.

Sticholotis obscurocincta, n. sp. — En ovale très court, très convexe, avec des ailes membraneuses d'un jaune pâle. Tête à ponctuation fine et serrée, à pubescence drue et dressée, d'un rouge

jaune, avec les palpes et les antennes de même couleur. Corselet droit sur les côtés, en demi-cercle à la base, avec les angles antérieurs et postérieurs à peu près droits, à ponctuation dense bien nette et assez forte, d'un rouge jaune, avec les bords latéraux très légèrement et très étroitement rembrunis. Écusson petit, jaunâtre. Élytres à peine plus larges que le corselet à la base, à angle huméral bien marqué, régulièrement arrondis de l'épaule à l'extrémité, à tranche subhorizontale médiocrement large; à ponctuation aussi forte mais un peu moins dense que celle du corselet, avec une ligne de points enfoncés circonscrivant au point culminant de la convexité un espace oblong lisse, juxtaposé, étendu environ du quart à la moitié de la longueur et une autre ligne de points plus gros à la partie interne de la tranche; d'un rouge jaunâtre avec une bordure externe noire, un peu plus large à l'extrémité qu'à l'épaule, couvrant environ le sixième de la largeur de l'élytre au milieu, assez vaguement limitée à la partie interne. Épipleures assez largement noirs en dehors, leur bord interne étroitement rembruni, leur partie médiane roussâtre. Dessous du corps roux avec la partie médiane du méso et du métasternum rembrunie; méso et métasternum avec quelques points espacés; espace intercoxal du 1^{er} arceau ventral ainsi que le dernier arceau à ponctuation bien plus dense. Pieds roux ainsi que les tarses. — Long. : 3 mill.

Bien distincte de *Stictobura trichroa* et de *St. semipolita* var. *testaceicollis* dont la rapproche sa coloration, outre les caractères génériques (corps ailé, calus huméral saillant), par sa ponctuation bien plus dense sur les élytres, le bord externe de la tranche non relevé et sa petite taille.

S. exsanguis, n. sp. — Hémisphérique, d'un roux plus ou moins foncé en dessus et en dessous. Tête à ponctuation extrêmement fine et peu dense, antennes et palpes flaves. Corselet à bords latéraux à peu près droits, à angles antérieurs aigus, avancés, les postérieurs obtus. Élytres arrondis à bord externe non explané, fortement et régulièrement convexes; ponctuation plus forte et moins dense que celle du corselet, avec quelques points plus gros, non en séries, le long du bord latéral. Dessous d'un roux un peu plus pâle que le dessus, à peu près lisse avec les épipleures bordés, en dehors, d'une fine lisière brunâtre. Pieds testacés. — Long. : 4,5 mill.

Semblable pour la couleur à *S. testacea* Weise, mais bien distincte par sa taille près de moitié moindre, par sa ponctuation beaucoup plus fine, sa forme plus convexe, non acuminée en arrière, ses élytres sans

rebord latéral explané. La *S. (Orcus) ferruginea* Gorth. s'en distingue par sa ponctuation bien plus forte et bien plus serrée, sa taille à peu près double et sa couleur plus brune et moins testacée, son aspect plus mat. Distinct de *gibbula* (*Apterolotis* = *Stictobura*) Weise, par sa taille plus petite, son corps ailé, la présence d'une fossette aux épi-
 pleures pour loger l'extrémité des fémurs postérieurs.

S. 6-punctata, n. sp. — En ovale court, médiocrement convexe, glabre, testacé. Tête flave, luisante, à ponctuation assez forte et moyennement dense, avec les palpes et les antennes testacés. Corselet une fois et demie plus long au milieu que sur les côtés, ceux-ci légèrement en ligne courbe, à angles postérieurs obtus, en arc de cercle large à la base, à ponctuation assez forte et médiocrement dense, bien marquée, avec les intervalles luisants. Écusson petit, en triangle allongé. Élytres un peu plus larges que la base du corselet, arrondis aux épaules, à rebord externe incliné, aminci sur les bords, à ponctuation semblable à celle du prothorax, sans ligne de points enfoncés sur le disque, médiocrement et régulièrement convexes; d'un testacé pâle, avec le rebord translucide et trois points noirs sur chacun : point 1 à la base, à égale distance du bord latéral et du point 3, ce dernier près de la suture dont il est séparé par une distance égale à son propre diamètre, situé en avant du point 2. Dessous et pieds testacés, à ponctuation assez forte, bien marquée. — Long. : 2,3 mill.

Cette espèce est très voisine de *S. nilghirica* Weise, dont elle diffère par sa forme un peu plus allongée, par la présence d'un point à la base, par les deux points médians placés sur une ligne un peu moins oblique et situés un peu plus en avant.

S. 10-punctata, n. sp. — Plus convexe, plus courte et plus luisante que la précédente. Tête rousse, à ponctuation fine et superficielle. Antennes et palpes testacés. Corselet une fois et demie aussi long au milieu que sur les côtés, ceux-ci à peu près droits, les angles postérieurs obtus, la base en arc de cercle large; dessus luisant, roux, à ponctuation fine et écartée. Écusson en triangle équilatéral, roux, finement ponctué. Élytres à peine plus larges que le corselet à la base, à côtés régulièrement arrondis, en cercle large à l'extrémité, à rebord très étroit, non incliné, à ponctuation semblable à celle du corselet; luisants, roux, à cinq points noirs : 1. 2. 2. Point 1 sur le calus huméral; 2 un peu avant le milieu, sur le disque, à égale distance de la suture et du bord latéral; 3 sur la même ligne transversale ou un peu plus antérieur, juxtasutural, contigu avec celui du

côté opposé, situé au point culminant de la convexité des élytres; 4 et 5 en ligne oblique, 4 voisin du bord latéral aux trois quarts de la longueur, au niveau de la courbure postéro-externe des élytres, un peu ovale dans le sens longitudinal; 5, à peu près à égale distance du point 3 et de l'angle apical, près de la suture dont il est un peu plus distant que le point 3. Dessous roux ainsi que les pieds, luisant, à ponctuation très fine et très espacée. — Long. : 1,8 mill.

Elle se rapproche de *S. 13-maculata* dont M. Andrews a bien voulu me communiquer les types, mais sa forme est un peu plus courte et son dessin différent.

Promecopharus, n. gen.

Ovale oblong, peu convexe, pubescent. Palpes maxillaires coniques. Antennes assez longues, dépassant le milieu des côtés du prothorax, premier article légèrement renflé, massue longue m'ayant paru uniaarticulée, ayant à peu près la longueur du tiers total de l'antenne, obliquement écourtée à l'extrémité, le nombre des articles m'a semblé être de neuf; base des antennes recouverte par une dilatation latérale de l'épistome qui contourne les yeux en dessous et ne les entame pas en forme de canthus. Yeux gros, arrondis, rapprochés, épistome en arc de cercle très large à sa partie antérieure, dilaté comme il a été dit; labre long semblable à celui des *Ortalia*. Corselet fortement échancré en avant, à angles antérieurs avancés, à bord antérieur recouvrant la tête jusqu'au delà des yeux, à base en arc de cercle large, non rebordée, transversal, légèrement rétréci en avant. Écusson petit triangulaire, aussi large que long. Élytres à peine plus larges que le corselet à la base, très faiblement arrondis sur les côtés, en ogive en arrière, avec un rebord latéral très étroit, prolongé jusqu'à l'extrémité. Épipleurs étroits, flaves, sans fossettes, prolongés jusqu'au troisième arceau abdominal. Prosternum large, légèrement convexe sur la ligne médiane, en arc de cercle large en avant, ne masquant pas les organes buccaux, tronqué en arrière; mésosternum carré; métasternum grand, convexe, marqué d'un fin sillon médian longitudinal. Premier arceau ventral grand, à lobe intercoxal large, tronqué en avant, les quatre autres très étroits. Plaques abdominales en forme de V très aigu, atteignant par leur extrémité à peu près le bord postérieur de l'arceau, à branche externe moins marquée que l'interne, étroites à la base. Pieds longs, fémurs dépassant les épipleures, sillonnés pour recevoir les tibias; ces derniers déprimés à l'extrémité pour recevoir les tarses.

Tarses de la longueur de la moitié des tibias. Ongles robustes, simples à l'extrémité, appendiculés à la base.

Ce genre se distingue de tous les autres par ses palpes maxillaires coniques, par ses antennes à massue longue et cylindrique, par la dilatation de l'épistome qui couvre la base des antennes, par ses plaques abdominales en triangle aigu.

P. Andrewesi, n. sp. — Ovale oblong, légèrement acuminé en arrière. Tête noire à pubescence grise très serrée et assez longue; antennes rousses, palpes roux à dernier article conique, éfilé, rembruni, à pubescence serrée, dressée, plus longue et plus dense le long du bord latéral. Écusson noir, ponctué. Élytres d'un noir brun plus clair à l'extrémité; luisants, à ponctuation plus forte et plus écartée que celle du corselet, à pubescence grise semi dressée, avec un fin rebord latéral très étroit; d'un noir brun plus clair à l'extrémité, avec trois taches d'un testacé jaunâtre: tache 1 allongée le long du bord externe qu'elle laisse étroitement libre, étendue longitudinalement du cinquième aux deux tiers de la longueur, sur le quart de la largeur; 2 en ovale, un peu en arrière de la partie antérieure de 1 du quart à la moitié de la longueur, sur le quart de la largeur, à peu près à égale distance de la suture et de la tache 1; tache 3 au niveau de la partie postérieure de la tache 1 entre celle-ci et la suture, en ovale transversal; ces taches à contour mal limité surtout la dernière dont la couleur se confond insensiblement avec celle de l'extrémité plus claire des élytres. Dessous noir brun foncé avec les épipleures roussâtres; pieds noirs avec l'extrémité des fémurs, les tibias et les tarses testacés.

var. **ancoralis**, nov. — Taches agrandies; la tache 1 réunie à la tache 2 à sa base et à la tache 3 à son extrémité; c'est-à-dire élytres jaunes sur leur moitié médiane avec le bord externe, la base, une tache réunie à la suture foncées. — Long. : 4,3 mill.

